



カルモセプチン軟膏

Calmoseptine®
Ointment

汎用モイスチャーバリア



長時間保護

湿気や腐食液による皮膚炎
の治癒を促進

不快感および痒みを一時的
に緩和

高い費用効果

処方箋不要

Calmoseptine®, Inc.

16602 Burke Lane • Huntington Beach, California 92647 • U.S.A.

800 800-3405 • FAX 714 840-9810

www.calmoseptineointment.com

Calmoseptine®

カルモセプチン軟膏 Ointment

以下の原因による炎症から皮膚を保護し、また皮膚炎の治療を促進します。

- 尿失禁、便失禁
- 栄養チューブの漏れ
- 軽いやけど、すり傷
- 糞瘻、膣瘻
- 排膿
- おむつかぶれ
- 発汗等による湿気

わずか48時間あまりで著しい効果

ケーススタディー #00305573 - 便失禁



81歳女性が、複数の皮膚潰瘍および下痢（8～10回/日）のため入院となった。尿失禁用フォーリーカテーテルが留置されていた。便の腐食作用により、肛門周囲の皮膚が8x10インチにわたって赤くただれていた。Calmoseptine Ointmentによる治療を開始した。



3日目には病態も落ち着き、肛門周囲に1x3インチの発赤部分を残すのみとなった。下痢は持続したが、皮膚炎については1日に2回Calmoseptine Ointmentを塗布したところ迅速な回復が見られた。

尿失禁はカテーテルによるコントロールが可能であったが、その後15ヶ月間にわたって下痢が間欠的に持続した。Calmoseptine Ointmentの使用により皮膚損傷を予防することができた。

-オデット・ハモンド、RN、CETNIによるケース・スタディー

使用方法

1. 皮膚を低刺激性の皮膚洗浄液を用いてそっと洗浄してください。皮膚を軽くたたくようにして乾かすか空気乾燥を行ってください。
2. 快適に長期間保護するため、Calmoseptine Ointment を発赤した炎症部分または被刺激部分に1日2～4回または失禁ごと、おむつの交換時に塗布して下さい。（one sentence is missing） 必要時には、Calmoseptine Ointment は、ベビーオイルまたは鉱油で簡単に落とすことができます。

注文情報

NDC#	寸法	ケースあたり
0799-0001-03	2.5オンス / 71g 瓶	12
0799-0001-02	2.5オンス / 71g チューブ	12
0799-0001-04	4.0オンス / 113g チューブ	12
0799-0001-05	3.5 グラムパケット	144

推奨されるスキンケアの基本的な考え方

- 皮膚を清潔に、潤いを保ち、表面乾燥を心がける。
- 寝たきりまたは車椅子の患者に対しては、「圧迫の軽減」を十分に行う。
- 栄養士が、患者の栄養状態を評価およびモニターする。
- 水分補給を十分に行う（水を毎日6～8 杯）。
- 皮膚科専門医やETナース（ストマ療法士）に相談する。
- 血液および体液に対する一般的予防措置を講じ、自分自身および患者を保護する。

有効成分
 メンソール 0.44%.....外用鎮痛剤 / 救急消毒薬
 酸化亜鉛 20.625%.....皮膚保護剤 / モイスチャーパーバリア
 成分: テモール、ラノリン、重碳酸ナトリウム、フェノール、クロロチモール、および軟膏基剤中グリセリン

警告: 外用に限ります。深傷、刺創へは使用しないでください。目との接触を避けてください。子供の手の届かないところへ置いてください。誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けるか、毒物管理センターへ連絡してください。7日以内に病状が悪化するか改善の見られない場合には、医師の診断を受けてください。

Calmoseptine®, Inc.

16602 Burke Lane Huntington Beach, California 92647 • USA.

800 800-3405 • FAX 714 840-9810

www.calmoseptineointment.com