

# Calmoseptine®

연고

다목적 수분 차단제



오래 지속되는 보호 효과

수분 또는 부식성  
배액으로 인한  
피부 염증을  
효과적으로 치료

통증 및 가려움을  
일시적으로 완화

저렴한 가격에  
만족할만한 효과

처방전 없이도  
구입 가능

**Calmoseptine®, Inc.**

16602 Burke Lane • Huntington Beach, California 92647 • U.S.A.

800 800-3405 • 팩스: 714 840-9810

[www.calmoseptineointment.com](http://www.calmoseptineointment.com)

# Calmoseptine® 연고

이 연고는 다음의 원인으로 인한 피부 염증을 치료합니다.

- 대소변 실금
- 영양관 누출
- 가벼운 화상, 찰과상
- 분변루 또는 질루
- 상처 배액
- 기저귀 피부염
- 땀 등의 수분

## 48시간여 후의 놀라운 효능

사례 연구 #00305573 - 대변 실금



첫 날, 81 세의 이 여성 환자는 복합적인 피부 궤양과 설사(매일 8-10 회)로 입원했으며, 요실금에 따른 도뇨관을 삽입하고 있었고, 분변 짓무름으로 인해 항문 주위의 피부가 8 x 10인치 정도 빨갱게 벗겨진 상태였습니다. 이 환자에게 Calmoseptine 연고를 바르기 시작했습니다.



사흘째 되던 날, 환자가 더 차분해지고 더 편안함을 느끼게 되었습니다. 항문 주위에 빨갱게 부은 부위는 1 x 3 인치 정도만 남기고 모두 사라졌습니다. 설사는 계속되었지만 Calmoseptine 연고를 하루 두 차례씩 바름으로써 치료 속도가 빨라졌습니다.

이 환자의 요실금은 도뇨관을 사용하여 조절하고 있었지만 이 환자는 이후 15 개월 이상을 간헐적인 설사 증세로 고생해야 했습니다. Calmoseptine 연고를 사용한 덕분에 피부가 손상되는 것을 막을 수 있었습니다.

- 사례 연구: Odette Hammond, RN, CETN

### 용법

1. 순한 피부 세척제로 피부를 부드럽게 닦습니다. 피부를 가볍게 두드려 말리거나 공기 중에 건조시킵니다.
2. 빨갱게 붓거나 염증이 생긴 피부에 매일 2-4 회씩 Calmoseptine 연고를 얇게 펴 바릅니다. 대소변 실금 후 또는 기저귀를 간주마다 연고를 발라주면 보호 효과를 더 오래 지속시키고 더 편안함을 느낄 수 있습니다. 염증이 난 피부를 부드럽게 닦은 후 Calmoseptine 연고가 남아있으면 피부에 남아 있는 연고를 그대로 둔 채 피부가 치료될 때까지 필요한 만큼 연고를 더 바르는 것이 좋습니다. 필요한 경우 베이비 오일이나 미네랄 오일로 Calmoseptine 연고를 쉽게 닦아낼 수 있습니다.

#### 주문 정보

NDC#	용량	포장 단위
0799-0001-03	2.5Oz / 71g 병	12
0799-0001-02	2.5Oz / 71g 튜브	12
0799-0001-04	4.0Oz / 113g 튜브	12
0799-0001-05	3.5g 패킷	144

#### 피부 보호를 위한 기본 상식

- 피부를 청결하게 유지하고 보습과 건조에 신경을 쓰십시오.
- 오래 누워 있거나 휠체어를 사용하는 환자에게는 적당한 "이완 운동"이 필요합니다.
- 영양 상태에 대한 영양사의 평가와 모니터링이 필요합니다.
- 적당량의 물을 섭취하십시오(매일 6-8 잔 정도).
- 장루 전문 간호사나 피부 전문가와 상담하십시오.
- 일반적인 혈액 및 체액 예방 지침을 준수하여 자신과 환자를 보호하십시오.

#### 유효 성분:

멘톨 0.44 % .....외용 진통제 / 응급 소독제  
 산화 아연 20.625 % .....피부 보호제 / 수분 차단제  
**성분:** 티올, 라놀린, 탄산수소나트륨, 페놀, 글로리톨 및 글리세린(적정 연고 주성분)

Calmoseptine, Inc.에서는 브로셔를 고객의 해당 언어로 번역하는 데 최선의 노력을 기울였습니다. 그렇지만 번역본 브로셔의 내용에 대한 정확성을 보증하지는 않습니다. 번역본에서 의문 사항이 발견되면 영문 브로셔를 참고하십시오.

**경고:** 바르는 약입니다. 복용하지 마십시오. 깊은 상처나 찢린 상처에 사용하지 마십시오. 눈에 닿지 않도록 주의하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 실수로 연고를 먹은 경우에는 즉시 의사의 진찰을 받거나 독극물 통제 센터에 문의하십시오. 상태가 악화되거나 7일 내에 호전되지 않으면 의사와 상담하십시오.

# Calmoseptine® , Inc.

16602 Burke Lane • Huntington Beach, California 92647 • U.S.A.

800 800-3405 • 팩스: 714 840-9810

www.calmoseptineointment.com