

฿ ขี้ผึ้ง Calmoseptine®

ขี้ผึ้งอเนกประสงค์ป้องกันความชื้น

The image displays three Calmoseptine Ointment products against a dark green background. On the left is a large white tube (NDC 0799-0001-04) with a green label. In the center is a smaller white tube (NDC 0799-0001-02). On the right is a white jar (NDC 0799-0001-03) with a green label. In front of the jar is a white sachet (DIN# 02226774) with a green label. All products feature the Calmoseptine logo and text describing its uses for protecting, soothing, and promoting healing of skin irritations.

การปกป้องยาวนาน

ช่วยลดอาการระคายเคือง
ของผิวหนัง เนื่องจาก
การแพ้ความชื้น
แพ้น้ำหนอง (caustic drainage)
ซึ่งทำให้ผิวหนังเป็นเม็ด
ผดผื่น แผลกดทับ หรือ
ผิวหนังถลอก

บรรเทาในระยะเวลา
ชั่วคราวอาการต่าง ๆ
ของผิวหนัง เช่น
อาการคัน
แสบ ฯลฯ

ให้ผลคุ้มค่า

หาซื้อได้โดยไม่ต้องใช้
ใบสั่งยา

ผลิตภัณฑ์ชั้นนำของสหรัฐอเมริกา Calmoseptine®, Inc.
16602 Burke Lane • Huntington Beach, California 92647 • U.S.A.

800 800-3405 • แฟกซ์ 714 840-9810

www.calmoseptineointment.com

ชีผึ้ง Calmoseptine®

ปกป้องและช่วยลดอาการระคายเคืองผิวหนังจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น:

- ภาวะกลืนปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้
- การรักษาแผลทะลุ (fistula) ในช่องทวารหนักหรือในช่องคลอด
- การรื้อของท่อให้อาหาร
- การระบายน้ำหนองจากแผล
- ผิวถลอก หรือ แผลเล็กน้อยจากการโดนไหม้
- ผื่นผ้าอ้อม
- ความชื้น เช่น การออกเหงื่อ

ให้ผลที่น่าพอใจภายใน 48 ชั่วโมง

กรณีศึกษา #00305573 – อาการกลืนอุจจาระไม่ได้



วันที่ 1

ในวันที่ 1 ผู้ป่วยหญิงอายุ 81 ปี ซึ่งได้เข้ารับการรักษารักษาในโรงพยาบาลด้วยเรื่องแผลลึกถึงทวารหนักที่กว้างวันละ 8-10 ครั้งใส่สาย Foley เนื่องจากกลืนปัสสาวะไม่ได้ ผิวหนังรอบทวารหนักขนาด 8 ซม. 10 นิ้วมีอาการแดงและหลุดลอกจากอุจจาระกัดกร่อน ได้เริ่มให้การรักษาด้วยชีผึ้ง Calmoseptine



วันที่ 3

เมื่อถึงวันที่ 3 อาการไม่สบายของผู้ป่วยลดลงและรู้สึกสบายตัวขึ้น ผิวหนังบริเวณทวารหนักที่ยังแดงอยู่มีขนาดเหลือ 1 x 3 นิ้วเท่านั้น สำหรับอาการท้องร่วงยังคงมีอยู่ แต่การทาชีผึ้ง Calmoseptine วันละสองครั้ง ทำให้ผิวหนังสมานอย่างรวดเร็ว

แม้ว่าผู้ป่วยยังคงใส่สายสวนเพื่อควบคุมอาการกลืนปัสสาวะไม่ได้ แต่ก็ยังมีอาการท้องร่วงเป็นระยะๆ ในช่วง 15 เดือนถัดไป การทาชีผึ้ง Calmoseptine ช่วยป้องกันการทำลายผิวหนังได้

– กรณีศึกษาโดย Odette Hammond, RN, CETN

วิธีใช้

1. ทำความสะอาดผิวหนังด้วยน้ำยาชนิดอ่อน ซับหรือปล่อยให้แห้ง ทาชีผึ้ง Calmoseptine บางๆ บริเวณผิวหนังที่แดงหรือระคายเคือง วันละ 2-4 ครั้ง หรือเมื่อกลืนปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ หรือหลังการเปลี่ยนผ้าอ้อม
2. เพื่อให้รู้สึกสบายผิว และการป้องกันอาการระคายเคืองได้ยาวนาน (หากมี Calmoseptine ตกค้างอยู่บนผิวหนังที่ระคายเคืองนั้นแม้ว่าจะได้ทำความสะอาดแล้วก็ตาม ขอแนะนำให้ปล่อยให้แห้งแล้วทาชีผึ้งเป็นชั้นบางๆ ทับได้ตามความจำเป็นจนกว่าผิวหนังจะสมาน) ชีผึ้ง Calmoseptine นี้สามารถล้างออกได้โดยง่ายด้วยน้ำมันสำหรับใช้กับเด็กเล็กหรือน้ำมันแร่ตามต้องการ

ข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อ

NDC#	ขนาดบรรจุ	จำนวนต่อกล่อง
0799-0001—03	ขวด 2.5 ออนซ์ / 71 กรัม	12
0799-0001—02	หลอด 2.5 ออนซ์ / 71 กรัม	12
0799-0001—04	หลอด 4.0 ออนซ์ / 113 กรัม	12
0799-0001—05	ช่อง 3.5 กรัม	144

สารออกฤทธิ์:

เมนทอล 0.44 %.....สารระงับอาการปวดไขภายนอก / ฆ่าเชื้อสำหรับปฐมพยาบาล
ซิงค์ออกไซด์ 20.625 %.....สารปกป้องผิวหนัง / สารป้องกันความชื้น
ส่วนประกอบ: ไขมัน, ลาโนลิน, โซเดียมไฮดรอกไซด์, ฟีนอล, คลอโรฟอร์มอล และกลีเซอริน ในชีผึ้ง

ส่งเสริมแนวคิดพื้นฐานในการดูแลผิวหนัง

- ดูแลผิวหนังให้สะอาด ชุ่มชื้น และแห้ง
- เปลี่ยนอริยาบถอย่างสม่ำเสมอให้ผู้ป่วยที่นอนบนเตียงหรือนั่งรถเข็นตลอดเวลา เพื่อบรรเทาแรงกดทับ
- ทำการประเมินผลและการเฝ้าระวังภาวะทางโภชนาการโดยนักโภชนาการ
- ให้ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ (วันละ 6-8 แก้ว)
- ปรึกษากับนักบำบัดทางด้านลำไส้ (ET Nurse) หรือผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
- ป้องกันตัวเองและผู้ป่วยโดยระมัดระวังไม่ให้มีการติดเชื้อที่อาจติดต่อทางเลือดและสารคัดหลั่งจากร่างกาย

คำเตือน: สำหรับใช้ทาภายนอกเท่านั้น ห้ามใช้กับแผลลึกหรือแผลถลอกทาง หลีกเลี่ยงไม่ให้สัมผัสถูกตา เก็บไว้ให้พ้นมือเด็ก กรณีที่กลืนกินโดยบังเอิญ ให้รีบพบแพทย์หรือศูนย์ควบคุมสารพิษในทันที หากอาการเลวลงหรือไม่ดีขึ้นภายใน 7 วัน ให้ปรึกษาแพทย์

ผลิตภัณฑ์ชั้นนำของสหรัฐอเมริกา Calmoseptine®, Inc.
16602 Burke Lane • Huntington Beach, California 92647 • U.S.A.

800 800-3405 • แฟกซ์ 714 840-9810

www.calmoseptineointment.com