



Thuốc mỡ Calmoseptine®

THUỐC CHỐNG ẨM ĐA NĂNG

**TÁC DỤNG BẢO VỆ
LÂU DÀI**

**CHỮA KÍCH ỨNG
DA DO
ẨM ƯỚT HOẶC
CHẤT BÀI TIẾT ẨM DA**

**TẠM THỜI LÀM DỊU
CẢM GIÁC KHÓ CHỊU &
NGỨA NGÁY**

**GIÁ CẢ PHẢI
CHẴNG**

**MUA KHÔNG CẦN
TOA BÁC SĨ**

Calmoseptine®, Inc.

16602 Burke Lane • Huntington Beach, California 92647 • U.S.A.

800 800-3405 • FAX 714 840-9810

www.calmoseptineointment.com

Calmoseptine®

Thuốc mỡ

BẢO VỆ VÀ CHỮA KÍCH ỨNG DA DO:

- ĐẠI TIỆN HOẶC TIỂU TIỆN KHÔNG TỰ CHỦ
- LỖ HỖ Ở ỚNG NUÔI ĂN
- TRẦY XUỚC, PHÒNG NHỆ
- LỖ RÒ ỚNG THÔNG PHÂN HOẶC ẦM ĐẠO
- DẪN LƯU VẾT THƯƠNG
- NỔI BAN DO MẶC TÃ
- ẦM ƯỚT, NHƯ RA MỜ HỒI

KẾT QUẢ RÕ RỆT CHỈ SAU HƠN 48 GIỜ

NGHIÊN CỨU TÌNH HUỚNG #00305573 - ĐẠI TIỆN KHÔNG TỰ CHỦ



Ngày thứ 1, người phụ nữ 81 tuổi này được nhập viện với nhiều vết loét da, tiêu chảy (8-10 lần một ngày), và được đặt một ống thông tiểu Foley, vùng da 8 x 10 inch quanh hậu môn tấy đỏ và đau do tác dụng của phân lên da. Được bắt đầu điều trị với Thuốc mỡ Calmoseptine.



Cho tới ngày thứ 3, bệnh nhân đã bớt bứt rứt và dễ chịu hơn. Chỉ còn một vùng tấy đỏ diện tích 1 x 3 inch quanh hậu môn. Vẫn còn tiêu chảy, nhưng nhờ bôi Thuốc mỡ Calmoseptine hai lần mỗi ngày, nên đã hồi phục nhanh chóng.

Mặc dù tình trạng tiểu tiện không tự chủ của bệnh nhân đã được điều chỉnh bằng ống thông tiểu nhưng bệnh nhân vẫn bị tiêu chảy từng cơn trong 15 tháng sau đó. Sử dụng Thuốc mỡ Calmoseptine đã ngăn cản tổn thương da.

– Nghiên cứu tình huống của Odette Hammond, RN, CETN

CHỈ DẪN

1. Làm sạch da nhẹ nhàng bằng chất tẩy rửa nhẹ. Lau khô nhanh hoặc để tự khô.
2. Thoa một lớp mỏng Thuốc mỡ Calmoseptine lên vùng da bị tấy đỏ hoặc bị kích ứng 2-4 lần một ngày, hoặc sau mỗi đợt đại/tiểu tiện không tự chủ hoặc sau mỗi lần thay tã để gây cảm giác thoải mái và bảo vệ lâu dài. (Nếu còn dư lượng Thuốc mỡ Calmoseptine trên vùng da bị kích ứng sau khi làm sạch nhẹ nhàng, nên để nguyên dư lượng này trên da và bôi thêm lớp thuốc mỡ cần thiết cho tới khi da bình phục). Có thể để dành làm sạch thuốc mỡ Calmoseptine bằng dầu dưỡng da cho trẻ em hoặc dầu khoáng khi cần thiết.

Thông tin Đặt hàng		
NDC#	CỖ	MỖI HỢP
0799-0001—03	Lọ 2.5Oz / 71g	12
0799-0001—02	Tuýp 2.5Oz / 71g	12
0799-0001—04	Tuýp 4.0Oz / 113g	12
0799-0001—05	Gói 3.5 Gam	144

THÀNH PHẦN HOẠT CHẤT:

Bạc hà 0.44 %.....Giảm đau bên ngoài / khử trùng khi sơ cứu

Zinc Oxide 20.625 %.....Bảo vệ da / chống ẩm

THÀNH PHẦN TÁ DƯỢC: thymol, lanolin, sodium bicarbonate, phenol, chlorothymol và glycerin với lượng đủ dùng.

KHUYẾN CÁO VỀ PHƯƠNG PHÁP CHĂM SÓC DA CƠ BẢN

- Giữ cho da sạch, ẩm và khô ráo.
- “Giảm đè ép” phù hợp cho những bệnh nhân liệt giường và ngồi xe lăn.
- Nhờ một chuyên gia dinh dưỡng đánh giá và theo dõi tình trạng dinh dưỡng.
- Uống nước đầy đủ (6-8 cốc hàng ngày).
- Tham vấn Y tá ET (BS chuyên khoa miệng ruột) hoặc một chuyên gia về da.
- Bảo vệ bản thân và người bệnh bằng cách tuân theo những cảnh báo chung về máu và dịch cơ thể.

CHÚ Ý: Chỉ sử dụng ngoài da. Không dùng cho vết thương sâu hoặc vết chàm chích. Tránh tiếp xúc với mắt. Để xa tầm tay trẻ em. Trong trường hợp vô ý nuốt phải thuốc, lập tức liên hệ với bác sĩ hoặc trung tâm chống độc. Nếu tình trạng bệnh xấu đi hay không tiến triển tốt sau 7 ngày, hãy tới gặp bác sĩ.

Calmoseptine®, Inc.

16602 Burke Lane Huntington Beach, California 92647 • U.S.A.

800 800-3405 • FAX 714 840-9810

www.calmoseptineointment.com